

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

総合感冒薬



大幸薬品

ひきはじめのかぜ症状に効く

**パンデカット**

第2類医薬品

- 漢方処方「麻黄湯エキス」と解熱鎮痛成分「アセトアミノフェン」により、かぜのひきはじめの悪寒や発熱に優れた効果を発揮します。
- 抗ヒスタミン成分「クロルフェニラミンマレイン酸塩」が鼻水・鼻づまり・くしゃみを抑え、「ジヒドロコデインリン酸塩」がせきを鎮め、「グアヤコールスルホン酸カリウム」がたんを出しやすくします。
- 携帯に便利なPTP包装。

### 【使用上の注意】⚠

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の方は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある方。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある方。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがあります。)

#### 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

#### 5. 服用時は飲酒しないでください。

#### 6. 長期連用しないでください。

#### 相談すること

#### 1. 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている方
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる方
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の方
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある方
- (6) 次の症状のある方  
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた方  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

##### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(裏面へ続く)

症状の名称	症 状
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合

**3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。**

便秘、口のかわき

### 【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 【用法・用量】

次の量を、食後なるべく30分以内に、水またはお湯といっしょに服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないでください	

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)定められた用法・用量を必ず守ってください。
- (3)カプセルの取り出し方は、右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、カプセルを取り出してください。  
(誤ってシートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります。)



### 【成 分】

6カプセル（成人の1日最大服用量）中、次の成分を含みます。

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	650mg	熱を下げ、痛みを和らげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水・鼻づまり・くしゃみなどの症状を抑えます。
ジヒドロコデインリン酸塩	18mg	せき中枢にはたらい、せきを鎮めます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg	気管にからまるたんをやわらかくし、排出しやすくします。
無水カフェイン	150mg	頭痛を和らげます。
麻黄湯エキス (マオウ……………1107.7mg) (キョウニン……………1107.7mg) (ケイヒ……………830.8mg) (カンゾウ……………553.8mg)	360mg (原生薬換算 3600mg)	鼻づまり、悪寒、発熱及び頭痛を伴うかぜの初期に用いられる漢方処方です。

添加物として、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含有しています。またカプセル本体にゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有しています。

### 【保管および取扱い上の注意】

- 1.小児の手の届かない所に保管してください。
- 2.誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器には絶対に入れかえないでください。
- 3.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 4.PTPシートのアルミ箔部分に破れ等が発生すると、湿気によりカプセルが変色することがありますので、取り扱いに注意してください。
- 5.使用期限を過ぎたものは、服用しないでください。

本剤の服用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

**大幸薬品株式会社 お客様相談係：電話(06)6382-1095**

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931

発売元  **大幸薬品株式会社**  
大阪府吹田市内本町3-34-14

製造販売元 **株式会社 廣昌堂**  
富山県射水市水戸田2841